

Symptômes chez les 0-17 ans moins de 24h

Si votre enfant présente des symptômes parmi ceux indiqués dans cette liste, il est recommandé de le garder à la maison et d'éviter les contacts avec les autres personnes. **Attendez 24 heures et réévaluez l'évolution des symptômes.**



Fièvre

Enfant de **0-5 ans** :

- température **rectale** de 38,5 °C (101,3 °F) et plus

Enfant de **6 ans et plus** :

- température **buccale** de 38,1 °C (100,6 °F) et plus



Symptômes généraux

- Perte soudaine d'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
- Grande fatigue
- Perte d'appétit importante
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)



Symptômes respiratoires

- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Essoufflement, difficulté à respirer
- Mal de gorge
- Nez qui coule ou nez bouché



Symptômes gastro-intestinaux

- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée
- Maux de ventre

Symptômes chez les 0-17 ans plus de 24h

0-5 ans	6-17 ans
<p>Un des symptômes suivants:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fièvre (38,5C et plus par voie rectale)• Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer• Fièvre modérée (38,1C ou plus) ET un des symptômes suivants:<ul style="list-style-type: none">- Nez qui coule (rhinorrhée)- Congestion nasale- Mal de gorge- Douleurs abdominales- Vomissements- Diarrhée	<p>1 des symptômes suivants:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fièvre• Perte du goût ou de l'odorat• Symptômes respiratoires: toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer <p>Ou 2 des symptômes suivants:</p> <ul style="list-style-type: none">• Maux de ventre• Vomissements• Diarrhées• Mal de gorge• Nez qui coule ou congestion• Grande fatigue• Perte d'appétit important• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)

Test négatif: fin de l'isolement

- 48h après la résolution de la fièvre (sans prise de médicaments)
ET
- 24 h après une amélioration significative des autres symptômes